

402 Alcaudón chico



Alcaudón chico. Verano. Hembra (11-VII).

ALCAUDÓN CHICO (*Lanius minor*)

IDENTIFICACIÓN

19-21 cm. Dorso gris; partes inferiores con tinte rosado; cabeza gris, con antifaz negro que sube sobre la frente; ala oscura con mancha blanca en la base de las primarias.

ESPECIES SIMILARES

El **alcaudón real** tiene un aspecto muy parecido pero es de tamaño mayor, la mancha blanca del ala es menos extensa, tiene una ceja blanca y carece de mancha negra sobre la frente.



Alcaudón real

SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con mancha de la frente de color negro azabache; **hembra** con mancha de la frente de color negro con plumas grises. Los **juveniles** no se pueden sexar.

CUIDADO: en otoño, después de la muda **postnupcial**, hay **machos** con mancha de la frente de color gris y **hembras** sin nada de negro.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo; partes superiores grises barreadas de gris oscuro; frente de color gris.

1º año con plumas de vuelo nuevas; aspecto como los **juveniles**, pero sin plumas barreadas de gris.

Adultos con plumaje desgastado; partes superiores grises uniforme; frente de color negro.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** parciales, abarcando plumas corporales y algunas coberteras del ala antes de la migración, en las zonas de cría. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada.

FENOLOGÍA


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival. Nidificante muy escaso y localizado en el oriente de la provincia de



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño de la cabeza (11-VII).



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño de la mancha de la frente (11-VII).

402 Alcaudón chico



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño del pecho (11-VII).



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño del dorso (11-VII).



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño del ala (11-VII).